

... ICD Care...



กรมการแพทย์
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

นางสาววิรงรอง มังกร
หอผู้ป่วยหนัก

อาการสำคัญ

1wk. ก่อนมารพ. หายใจไม่สะดวก เหนื่อยง่าย

อาการปัจจุบัน

ปี 2560 ไอปนเลือด ไปรักษาที่รพ.หัวหิน ทำ CXR&CT Chest พบ
Mass Refer to สถาบันโรคทรวงอก ทำ Bx. ผล : NSCLC
Refer to รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี เพื่อรับการรักษาด้วยการฉายรังสี

แรกรับ

ผู้ป่วยรู้ตัว หายใจไม่สะดวก เหนื่อย CXR พบ Pleural effusion
แพทย์จึง on ICD Plan Refer ต้นสังกัด

ข้อบ่งชี้ในการใส่ท่อระบายทรวงอก

1. มีอากาศในช่องเยื่อหุ้มปอด
2. มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด
3. มีหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด
4. มีเลือดขังในช่องเยื่อหุ้มปอด




... ICD Care...

นางสาววิรงรอง มังกร
หอผู้ป่วยหนัก



การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอก

ผู้ป่วยรู้ตัว on ICD แบบ 3 ขวด ต่อ suction



1. ตรวจสอบการต่อของระบบระบายทรวงอกให้ถูกต้องทุก 8 ชั่วโมง
2. สังเกตการกระเพื่อมขึ้นลงของระดับน้ำในหลอดแก้วและลมปุดในหลอดแก้ว
3. จัดสายยางไม่ให้หักพับงอ ไม่ให้ห้อยโค้ง
4. ดูแลให้ขวดรองรับสารเหลวอยู่ต่ำกว่าระดับทรวงอกของผู้ป่วยประมาณ 2-3 ฟุตเสมอ
5. กรณีต่อแบบ 3 ขวด ดูแลควบคุมความดันจากเครื่องดูดให้อยู่ประมาณ 10 เซนติเมตรน้ำ
6. แนะนำให้ผู้ป่วยเปลี่ยนท่านอนอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง โดยการใช้มือประคองสายท่อระบายทรวงอกขณะเปลี่ยนท่านอน ระวังระวังไม่นอนทับสายท่อระบายทรวงอก
7. สังเกตอาการ ลักษณะการหายใจ ประเมินสัญญาณชีพทุก 1-2 ชั่วโมงแรก
หากพบว่าอาการและสัญญาณชีพคงที่ประเมินทุก 4 ชั่วโมง

